

Stojíte na cestě vedoucí po hrázi rybníka Allah VII. Tento rybník je součástí soustavy Liechtensteinských rybníčků, jejichž název je odvozen od blízké osady Aloch, která zanikla v 15. století.

První zmínka o této rybníční soustavě pochází z roku 1764. Původně bylo na vodním toku Alah (též Allah) rybníčků sedm a sloužily k odchovu rybího plůdku. Do roku 2000 se plně funkční dochoval pouze jeden, a to Allah I. V roce 2000 byla společností Lesy České republiky, s. p. provedena revitalizace. Z důvodu nedostatečného průtoku nedošlo k obnovení rybníčků na jejich původní počet. I když v současné době tvoří soustavu pět rybníčků, daří se každoročně napouštět pouze Allah I a Allah VII.

V časném jarním období můžete u rybníků zastihnout několik druhů žab, které se u nádrží se páří a kladou do vody svá vajíčka. Larvy – pulci žijí ve vodním prostředí a dýchají pomocí žaber. Po ukončení vývoje a přeměně v dospělé žáby zpravidla vodu opouští a vrací se zpět až v době rozmnožování. Jen tzv. zelení skokani a kuňky se i přes léto zdržují ve vodě.



Tři Grácie



Pěšinou kolem rybníčka se dostanete ke chrámu Tří Grácií s podkovovitou kolonádou a sousoším tří antických bohyní. Od chrámu můžete průhledem pozorovat Rybníční zámek na opačném břehu prostředního rybníka.

skokan zelený
Pelophylax esculentus

Hlasité noční žabí koncerty mají na svědomí zelení skokani. Při skřehotání se jim v koutcích úst vychlípují rezonanční měchýřky.



rosnička zelená
Hyla arborea

Tato drobná žabka se pomocí přísavky na koncích prstů obratně pohybuje po vegetaci, zastihnout ji můžete i na stromech. Zbarvení kůže dokáže měnit do různých odstínů zelené i hnědé, podle barvy podkladu, na kterém sedí.



kuňka obecná
Bombina bombina


Drobná, při pohledu shora nenápadná žába. Na spodní části těla má výrazné oranžové až červenavé skvrny. Výrazného zbarvení využívá při napadení predátory jako výstrahu: „Pozor, jsem jedovatá!“



ropucha obecná
Bufo bufo

Nejmohutnější žába, s níž se lze běžně setkat i v blízkosti lidských sídel. Za očima má umístěny velké příušní jedové žlázy s dráždivým sekretem, který může vyvolat podráždění kůže.

Jak probíhá vývoj ropuchy obecné:




blatnice skvrnitá
Pelobates fuscus

Naše jediná žába, která má za denního světla zorničku oka orientovanou vzhůru. Po většinu roku je aktivní za soumraku a v noci, den tráví zahrabaná v zemi.



protěž žlutobílá
Pseudognaphalium luteoalbum

Na rybníčcích, které v průběhu roku vlivem nedostatku vody vysychají, se vytvářejí vhodné podmínky pro vzácné druhy rostlin, jako například tuto protěž žlutobílou.



Víte, že pro blatnici skvrnitou se dříve používal název blatnice česneková? Tato žába totiž při podráždění vylučuje sekret vonící po česneku.